

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалиста)
по медицинскому применению препарата



КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ

Регистрационный номер: П N012477/01

Торговое название: катеджель с лидокаином

МНН или группировочное название: лидокаин + хлоргексидин &

Лекарственная форма: гель для местного применения

Состав: 100 г содержат:

<i>активные вещества:</i>	лидокаина гидрохлорида	2,00 г
	хлоргексидина дигидрохлорида	0,05 г
<i>вспомогательные вещества:</i>	гизтеллозы (гидроксиэтилцеллюлозы)	1,50 г
	глицерола	20,00 г
	воды для инъекций	до 100,00 г

Описание: прозрачный, бесцветный или почти бесцветный гель

Фармакотерапевтическая группа:

антисептическое средство + местноанестезирующее средство

Код АТХ: G04A

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, оказывающий антисептическое и местноанестезирующее действие. Хлоргексидин – противомикробный препарат, действующий на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи, дерматофиты. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий – *Treponema ssp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas ssp.*, *Chlamydia ssp.*, *Ureaplasma ssp.* Сохраняет активность (хотя несколько сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.

Лидокаин – местный анестетик.

Противомикробное действие и адекватная анестезия развиваются через 5-10 мин после применения препарата.

Водорастворимый прозрачный гель обеспечивает четкий оптический обзор и обладает смазывающим эффектом при различных эндоскопических процедурах.

Показания

Профилактика инфекции, анестезия при оперативных и диагностических эндоскопических вмешательствах у детей и взрослых в урологии, гинекологии, проктологии, все формы эндоскопии, замена фистульных катетеров, интубация.

Применяется в комплексной терапии при купировании симптомов воспаления (сопровождающихся болевым синдромом) слизистой оболочки мочеиспускательного канала, влагалища, цервикального канала и прямой кишки.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

С осторожностью – беременность (I триместр).

В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.

Способ применения

Для медленной инстилляцией перед введением инструментов (врачом или специально обученным персоналом) необходимо:

- раскрыть блистер, удаляя бумагу с прозрачного корпуса (по возможности только до перетяжки);
- отломать кончик без значительного усилия (по возможности еще в упаковке). При этом

- необходимо проследить, чтобы кончик был полностью удален, во избежание повреждения слизистой. Для облегчения введения рекомендуется предварительно выдавить каплю геля;
- инстилляцию посредством легкого давления на гофрированный шприц. После опорожнения шприца необходимо держать его в сжатом состоянии до изъятия;
 - введение инструментов рекомендуется проводить через 5-10 мин после инстилляцией геля.

Побочные действия

При повышенной чувствительности возможны аллергические реакции (аллергический дерматит, кожная сыпь, ангионевротический отек), жжение в месте аппликации.

Передозировка

Симптомы (при системном действии лидокаина в случаях тяжелых повреждений мочеиспускательного канала): брадикардия, судороги, коллапс.

Лечение: при брадикардии – бета-адреностимуляторы, при судорогах – барбитураты или миорелаксанты короткого действия, при коллапсе – эпинефрин или допамин вводится внутривенно.

Взаимодействие

Избегать совместного применения с препаратами йода.

Ингибиторы MAO усиливают местноанестезирующее действие лидокаина.

Несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Совместим с лекарственными средствами, содержащими катионную группу (бензалкония хлорид).

Особые указания

Препарат стерил и предназначен для однократного введения.

В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.

Формы выпуска

По 12,5 г в однократный полипропиленовый гофрированный шприц с вытянутым и отламывающимся наконечником. Шприц помещают в блистер, состоящий из двух частей : верхняя – полипропиленовая пленка, выдерживающая стерилизацию паром, нижняя – бумажная.

1. Блистер вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку.

2. Упаковка для стационара:

По 5 или 25 блистеров помещают в картонную коробку, на боковой стороне которой печатается текст инструкции по применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от + 15 до + 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек

По рецепту.

Производитель

«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.», Зальцбергштрассе 96, 6067, Абзам, Тироль, Австрия.

Организация, принимающая претензии потребителя

Представительство компании «Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.» в Москве: 107150 г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, стр. 3, тел./факс: (495) 781 71 08.